



ဆေးခြောက်သည် စိတ်ဓါတ်လျော့ကျစေတတ်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ဦးနှောက် နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုနွေးကွေးစေသည်။ ဆေးခြောက်တွင် ဓာတုဗေဒပစ္စည်း THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) ပါဝင်၍ ၎င်းသည် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်သက်ရောက်မှုများရှိပါသည်။ ဆေးခြောက်သည် ဦးနှောက်အာရုံနှင့် အတွေးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

ရေတိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။

လူတို့သည်စိတ်သက်သာရာရရန်သို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုကူညီရန်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးခြောက်သည်လူအများအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းမတူညီပါ။ မည်မျှပြင်းထန်သည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည်၊မည်မျှအသုံးပြုသည်၊အခြားဆေးဝါးများ(ဆေးရွက်ကြီးအပါအဝင်)နှင့်သုံးဆောင်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန် နှင့်ကျန်းမာရေးစရှိသော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်သည်။ စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုအဆင့်မရှိကြောင်း သိရန်အရေးကြီးပါသည်။

ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။

- စိတ်ဓါတ်လွှဲဆော်မှုလျော့နည်းခြင်း။
- မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုပြဿနာများ။
- ကာမစိတ်လျော့ချခြင်း။
- ကင်ဆာ
- ရုတ်တရက်အကြောင်းမဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း။
- စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း။
- စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း။
- စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု။
- အကြောက်လွန်ရောဂါ။

ဆေးခြောက်ကို ပုံမှန် အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ညီဖွင်းသောဆက်ဆံရေး နှင့် ဘဝကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းရှိကြပါသည်။

ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာပြဿနာများ ယခင်ကရှိခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုမှတ်တမ်းရှိခဲ့လျှင်၊ အကြောက်လွန်ရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်လွတ်ခြင်းအပါအဝင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ပြဿနာ၏လက္ခဏာများ။

- ဆေးခြောက်သုံးစွဲရန်အတွက်အချိန်များစွာကုန်ခြင်း။
- ကြီးမားသောပမာဏကိုအသုံးပြုခြင်း။
- တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်ပိုမိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်း။
- အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်လျော့ချရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ကြုံနေရခြင်း။
- မိသားစုပြဿနာများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာများ သို့မဟုတ်ရဲနှင့်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ချခြင်း။

ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူအချို့သည်ရပ်တန့်ရန်အခက်အခဲတွေ့ကြုံတတ်သည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်ဆေးခြောက်ကိုအားကိုးနေရသောအခါ၊ ရပ်တန့်သည့်အခါ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများတွင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်း၊စိုးရိမ်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းနည်းခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း နှင့်တပ်မက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကိုလျော့ချရန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအကြိမ်များအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

- သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်လျော့ချရန် သင့်အကြောင်းပြချက်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။
- ဆေးခြောက်ကိုဆေးရွက်ကြီးနှင့်မရောနှောပါနှင့်။
- သင်ဆေးခြောက်မည်မျှသုံးစွဲသည်ကိုကန့်သတ်ပါ။
- အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရာများကိုရှောင်ပါ။ ယင်းတို့မှာ နေရာများ၊ လူများနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ။
- သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ မိသားစုဝင်သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ကိုအကူအညီတောင်းပါ။



ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းသည်ဆင့်ပွား ရောဂါဖြစ်ခြင်း၏မြင့်မားသောနှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေစဉ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်သူများသည်မိမိတို့၏ဆရာဝန်အားပြောဆို သင့်သည်။

အကူအညီရနိုင်သည်။

အေးဒစ်(စ်) ၂၄/၇ (Adis 24/7) အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထောက်ပံ့ မှုသည် ကွင်းဆလန်း (Queensland) ရှိအရက်နှင့်အခြားမူးယစ် ဆေးဝါးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိသူများ၊ သူတို့အပေါ် သံယောဇဉ်ရှိသူများ နှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအတွက် အတွက် ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက်တစ် ပတ် လျှို့ဝှက်ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်သည်အရက်သို့မဟုတ် အခြား မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်စကားပြောလိုပါက Adis သည် စကားပြန်တစ်ဦးကိုစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စကားပြောပါ။ ဘယ်အချိန်မဆို၊ ဘယ်နေရာ မှာမဆို။ ၁၈၀၀ ၁၇၇ ၈၃၃

အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဘာလုပ်ရမလဲ။

တစ်ဦးတစ်ယောက်ကပြင်းထန်သောစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း၊ စိုးရိမ် ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ် အကြောက်လွန်ရောဂါခံစားနေရပါက သူတို့ကိုငြိမ် သက်စွာ နှင့် လုံခြုံစွာထားပါ။

အကယ်၍ထိုလူသည်လဲကျခြင်း၊သို့မဟုတ်သတိမရခြင်းဖြစ်နေ ပါက၊ သူညသုံးလုံး (000) ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ကားကိုခေါ်ပါ။ အကယ်၍အသက်ရှူရပ်သွားခဲ့သော်၊ CPR အသက်ကယ် ဆယ် ခြင်းစပါ။အကယ်၍ သူတို့သည်ပုံမှန်အသက်ရှူနေပါက နာလန်ထူ အနေအထားပုံစံတွင်ထား ပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ။

